

FRONTLINE® SPRAY

Antiparasitario externo para el tratamiento y
prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas

en spray de uso tópico.

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Aerosol tópico (Aer.t.)

Composición por ml:

Fipronil 2,50 mg y excipientes (copovidona, isopropanol y agua purificada csp).

Propiedades farmacológicas

El fipronil, perteneciente a la familia de los fenilpirazoles, actúa como inhibidor no competitivo del GABA del sistema nervioso de los parásitos.

La cantidad de fipronil absorbida por la piel después de la pulverización del producto sobre el pelo y la piel es prácticamente nula.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Perros y Gatos: Parasitosis externas. Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus sanguineus*) en el perro.

- Tratamiento y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides* spp.) y garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus* spp., *Ixodes scapularis*, *Dermacentor variabilis*) en el gato.
- Frontline® Spray elimina las pulgas del animal tratado, por lo que puede ser utilizado como parte de la estrategia en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP).
- Tratamiento y control de las infestaciones por piojo picador (*Trichodectes canis*) en el perro y (*Felicola subrostratus*) en el gato.
- Puede usarse durante la gestación y la lactación.



Contraindicaciones

- No utilizar en animales enfermos (enfermedad sistémica, fiebre) o convalecientes.
- No utilizar en conejos.

Efectos secundarios

- En caso de lamido, puede observarse un breve período de hipersalivación debido principalmente a la naturaleza del excipiente.
- De forma esporádica se han comunicado las siguientes reacciones adversas después de la utilización del producto: Reacciones cutáneas transitorias, eritema, prurito o alopecia.
- Excepcionalmente, tras la administración del medicamento, se ha podido observar hipersalivación, síntomas neurológicos reversibles (hiperestesia, letargia, síntomas nerviosos, ataxia), vómitos o síntomas respiratorios.
- Administrar la dosis recomendada.

Vía de administración

Externa por pulverización.

- Pulverizar toda la superficie del animal manteniendo el frasco a una distancia de 10 a 20 cm. Repartir de manera uniforme y a contrapelo, para que toda la piel quede mojada, evitando pulverizar los ojos.
- Friccionar después de la aplicación, para que el producto penetre hasta la piel. Dejar que el producto se seque de forma natural. No secar con toallas. Procurar que el animal tratado no se lama antes de estar completamente seco.
- No bañar al animal durante las 48 horas anteriores y posteriores al tratamiento.

Posología

Aplíquese 3 a 6 ml/kg p.v.; 3 ml/kg p.v. en animales de pelo corto; y hasta 6 ml/kg p.v. en animales de pelo largo.

Frontline® *Spray* 100 ml: 3 ml = 6-12 pulverizaciones.

Frontline® *Spray* 250 ml: 3 ml = 2-4 pulverizaciones.

Frontline® *Spray* 500 ml: 3 ml = 2-4 pulverizaciones.

- El producto es activo durante 2 meses frente a pulgas y durante 1 mes frente a garrapatas. El tratamiento frente a garrapatas se hará como mínimo una vez al mes.
- Frente a piojos, es necesario volver a tratar al animal a las 4 semanas de realizada la primera aplicación.
- Como parte de la estrategia en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas (DAP) se recomienda una aplicación mensual en los animales alérgicos y en los que convivan con ellos.

Precauciones especiales

- Es importante asegurarse de que los animales no se lamen los unos a los otros después del tratamiento.
- No bañar a los perros durante los 2 días anteriores o posteriores a su aplicación.
- Evitar el contacto con los ojos del animal. Este producto puede causar irritación ocular y de la mucosa. Por lo tanto, debe evitarse el contacto del producto con la boca o con los ojos. Evitar el contacto del producto con los dedos. Si esto ocurre, lávese las manos con agua y jabón.
- Utilice guantes para evitar el contacto con el producto. Los animales tratados no deben ser tocados hasta que el punto de aplicación esté seco.
- No fumar, beber o comer durante la aplicación.

Tiempo de espera

No se aplica.

Modo de conservación

Protéjase del calor.

Observaciones

Sin prescripción veterinaria.

Presentación

Frontline® *Spray* para pulverización de 100 ml.

Frontline® *Spray* para pulverización de 250 ml.

Frontline® *Spray* para pulverización de 500 ml.

Reg. N°

1.084-ESP